3.12. Participatiemeetinstrumenten behandeling CP

Uitgangsvraag

Wat is de plaats van participatiemeetinstrumenten bij de behandeling van kinderen met spastische CP?

Praktische uitwerking van de aanbeveling

Gebruik de LifeH, LAQ-CP, CAPE en APCP vragenlijsten om participatie te meten bij personen met spastische CP. Gebruik de volgende criteria om een meetinstrument te kiezen:
de domeinen van participatie die je wilt meten
aansluiting van het meetinstrument bij de leeftijd van het kind
de gewenste (maximale) afnameduur
wijze van afname

Daarnaast kun je de PEM-CY of CASP gebruiken. Deze zijn nog niet getest bij kinderen met spastische CP.

Gebruik de COPM of de GAS om individuele doelen op participatieniveau te meten.

Ontwikkelingen in participatiemeetinstrumenten

Dit onderdeel van de richtlijn dateert uit 2015. Participatie vraagt steeds meer aandacht. Er zijn veel ontwikkelingen in participatiemeetinstrumenten. Het is belangrijk om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen. Zie ook de geheel herziene uitgave van het boek Kinderrevalidatie uit 2021 (ISBN 9789023257769). In het hoofdstuk ‘Meetinstrumenten’ worden de nieuwste ontwikkelingen van de Participatiemeetinstrumenten beschreven.

Wat ga/kan je per fase doen om de aanbeveling te implementeren?

Hoe zorg ik dat mijn collega's ...	Ideeën voor strategieën en acties
... voor deze aanbeveling openstaan	Bepaal als team welke instrumenten jullie gebruiken. De richtlijn beveelt verschillende instrumenten aan. Volg de ontwikkelingen in participatiemeetinstrumenten.
... deze aanbeveling begrijpen	Geef informatie over de eigenschappen en bruikbaarheid van de verschillende instrumenten. Gebruik hiervoor **bijlage 1**.
... de aanbeveling willen gebruiken	Kijk voor elk instrument of het beschikbaar is en aansluit bij de doelgroep/leeftijd. Informatie over participatiemeetinstrumenten: • APCP is vertaald naar het Nederlands en geschikt voor het jongere kind • LifeH, zie voor meer informatie over LifeH • LAQ-CP is gericht op de Engelse cultuur en minder geschikt voor de Nederlandse situatie. Sommige items zijn niet van toepassing op revalidatie. Het instrument vraagt naar de beleving van de ouder. Het zijn veel en lastig te beantwoorden vragen. Zie voor meer informatie over LAQ-CP • PEM-CY, zie voor meer informatie over PEM-CY • CAPE, zie voor meer informatie over CAPE Een aanvullend meetinstrument op de CAPE is de PAC. Zie voor meer informatie over PAC De richtlijn noemt de PAC niet • COPM, zie voor meer informatie over COPM • GAS, zie voor meer informatie over GAS
... de aanbeveling kunnen gebruiken	Participatiemeetinstrumenten downloaden: • APCP is vertaald naar het Nederlands maar niet beschikbaar • LifeH is beschikbaar via download LifeH • LAQ-CP is beschikbaar via download LAQ-CP • PEM-CY de Nederlandse versie is beschikbaar via CanChild download PEM-CY • CAPE en PAC zijn vertaald naar het Nederlands maar niet beschikbaar

	• COPM is beschikbaar via download COPM of op te vragen via Ergotherapie Nederland. Deze wordt meestal door ergotherapeuten afgenomen • GAS, zie handleiding GAS met GAS-formulier
De aanbeveling gebruiken/toepassen: Doen!	Maak werkafspraken met het team over: • Wie de vragenlijst afneemt • Aan wie de resultaten worden teruggekoppeld • Hoe gegevens worden opgeslagen • Let op ontwikkelingen in participatiemeetinstrumenten. Doe hier ervaring mee op en deel deze op het forum voor knowledge brokers
- in eigen behandeling	Plan tijd voor het afnemen en rapportage. Plan tijd voor terugkoppeling naar ouders.
- in communicatie collega's	Spreek af hoe de resultaten van de vragenlijst worden teruggekoppeld naar collega's.
- in communicatie ouders	Bespreek de resultaten van de vragenlijst met jongeren en ouders.
De aanbeveling blijven gebruiken, ook in de toekomst: Blijven doen!	Evalueer de werkafspraken. Neem participatiemeetinstrumenten op in casuïstiekbesprekingen en intervisie. Neem participatiemeetinstrumenten op in het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Evalueren het gebruik van participatiemeetinstrumenten. Heb aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.